

BIOSOL

XARXA DE SEGUIMENT DE LA BIODIVERSITAT DEL SOLSONÈS

CENS DE PERDIU XERRA I CORALET




Perdiu xerrra (*Perdix perdix*)



Espècie molt escassa a la comarca que es troba a l'oest del port del Comte. També coneguda com a perdiu grisa. Menys de 600 parelles a Catalunya. Vulnerable.

Té les parts inferiors més clares i el [cap castany rogenc](#). El [mascle](#) presenta una taca castany fosca en forma de [ferradura](#) al pit i el cap més vermell.



Diferències amb la perdiu roja que cohabita a la zona:

La perdiu roja, té el plomatge més ratllat de negre, la gola blanca amb una ratlla negra i una franja blanca a sobre l'ull.

En vol molt marró per sobre les ales i clares per sota i es veu el ratllat al pit i la cara blanca.

La perdiu xerra és més grisa, amb les ales ratllades per sobre i el cap tot ell ataronjat.



Berberis vulgaris L. subsp.
seroi O. Bolòs et Vigo

Família : [Berberidàcies](#)

Gènere : [Berberis](#)

CORALET



Distribució geogràfica general:

Submediterrània

Cartografia: [mapa](#)

Hàbitat: Bardisses, matollars

Substrat: Calcari


Forma vital: Macrofaneròfit

Mida: 1-3 m.

Codi: 0184c

Llistes: [Flora protegida del Principat](#)

Floració:



Què cal fer:

1. Es fa un cens simultani a les vesants on viu.
2. Es camina en bateria de gent en fila al llarg de la pendent separats uns 20 m. S'avança a poc a poc mirant tot el què es mou o comença a volar. Un cop identificada amb els binocles, la fila es para i s'apunta tot: el punt (x,y en wgs84), l'hora i la direcció on ha marxat.
3. Es fa una foto de l'hàbitat on s'ha vist. Es continua caminant endavant.
4. Mentre es camina si es troba un arbust espinós de flors grogues ente els boixos pot ser el coralet. Cal anar-hi i fer algunes fotos de detall i apuntar coordenades x,y.
4. Enviar-ho tot a: david.guixe@ctfc.cat

Per dubtes podeu trucar al 660258153.David.